Comment utiliser le piège

Le piège distribué doit être utilisé avec méthode, afin de limiter son impact sur les autres insectes.



- Munissez vous d'un bocal en verre de 8cm de diamètre (pot de confiture, conserve en verre, ...)

- Imbibez une surface absorbante (éponge, tissus, ...) d'un mélange d' ¼ de bière brune, ¼ de vin blanc et ½ de sirop de fruit (type grenadine) et placez dans le fond du bocal

- Refermez avec le couvercle

- A l'aide d'une ficelle, placez le piège dans une zone ombragée

- Vérifiez chaque semaine que votre éponge soit toujours imbibée de liquide



IMPORTANT

- Le piège ne remplace pas le **signalement des nids.**
- Même si des frelons sont capturés, **un nid peut être présent à proximité.**

Vous observez un frelon ou un nid : que faire ?

En cas de suspicion :

Gardez vos distances
N'approchez pas du nid et ne tentez aucune destruction.

Trois cas de figure :

1. Si le nid est sur votre propre propriété, faite procéder à l'élimination du nid par vos propres soins et avec l'aide d'un opérateur agréé.

2. Si le nid se trouve sur une parcelle privée ne vous appartenant pas, signalez le à l'administration.

3. Si le nid se situe sur le domaine public, signalez le à l'administration qui se chargera de faire procéder à son élimination.

Contact communal :

Service de prévention

Tel : 064/230.604
Mail : prévention@binche.be

Ed. responsable : Collège communal de Binche
Rue Saint-Paul 14, 7130 Binche

LE FRELON ASIATIQUE

Apprendre à le reconnaître et à réagir



Une espèce invasive à surveiller pour protéger la biodiversité et éviter les risques près des habitations.

Ville de
Binche.

Pourquoi le frelon asiatique pose problème ?

Le frelon asiatique est un insecte exotique envahissant. Il exerce une forte pression sur les **abeilles, les pollinisateurs** et plus largement sur **la biodiversité.**


Il peut également représenter un **risque** pour **la population** lorsqu'un nid est installé à proximité d'une habitation, d'un jardin, d'une école, d'un sentier ou d'un espace public.

Une piqûre isolée est généralement comparable à celle d'une guêpe ou d'une abeille. En revanche, l'approche d'un nid peut déclencher une attaque collective, beaucoup plus dangereuse, surtout en été. C'est pourquoi il ne faut **jamais tenter de détruire un nid soi-même.**

À RETENIR

- Espèce invasive
- Menace pour les pollinisateurs
- Danger accru à proximité d'un nid
- Neutralisation uniquement par des professionnels

Reconnaitre le frelon asiatique



TAILLE : 3CM

COMMENT DIFFÉRENCIER LE FRELON ASIATIQUE ET EUROPÉEN

Le frelon européen, lui, est souvent plus jaune et plus roux. Le frelon asiatique paraît **plus foncé** au premier regard. Il est également **un peu plus petit** que le frelon européen.

Reconnaître un nid de frelon asiatique



NID PRIMAIRE (DE MARS À MAI)

- de forme sphérique ;
- taille d'une mandarine puis d'une orange (ø 8-10 cm) ;
- entrée circulaire, située tout en bas ;
- construit généralement à quelques mètres du sol, dans un abri (boîte aux lettres, car-port, abri de jardin, nichoir, ...).

NID SECONDAIRE (DE JUIN À OCTOBRE)

- de forme ovoïde (goutte d'eau) ;
- nid de grande taille (peut atteindre 80 cm de diamètre) ;
- petite ouverture latérale située à mi-hauteur ;
- Souvent dans un arbre à plus de 10 mètres de haut.



ATTENTION

- Ne pas secouer les branches
- Ne pas utiliser d'eau, de feu ou d'insecticide
- Ne pas intervenir soi-même
- Éloigner enfants et animaux

L'approche (volontaire ou accidentelle) d'un nid secondaire de frelon asiatique est une action dangereuse ! Elle peut déclencher l'attaque collective de la colonie et s'accompagner de piqûres multiples sur le corps, de la projection de venin et de liquides acides dans le visage pouvant nécessiter une hospitalisation d'urgence.